

La prise des médicaments mentionnés au verso doit être interrompue en cas d'apparition des symptômes suivants :

fièvre
vomissements ou diarrhées multiples
douleurs abdominales
sentiment de maladie prononcé

La prise doit également être interrompue en cas de jeûne (>24 heures) ou si un régime pauvre en glucides a été entamé.

La prise des médicaments mentionnés au verso doit être interrompue en cas d'apparition des symptômes suivants :

fièvre
vomissements ou diarrhées multiples
douleurs abdominales
sentiment de maladie prononcé

La prise doit également être interrompue en cas de jeûne (>24 heures) ou si un régime pauvre en glucides a été entamé.

Inhibiteurs SGLT2: _____

autres: _____

Ne reprenez ces médicaments que lorsque vous vous sentirez en bonne santé et que vous aurez recommencé à manger et à boire normalement pendant deux jours.

En cas de doute, contactez votre médecin traitant !

Inhibiteurs SGLT2: _____

autres: _____

Ne reprenez ces médicaments que lorsque vous vous sentirez en bonne santé et que vous aurez recommencé à manger et à boire normalement pendant deux jours.

En cas de doute, contactez votre médecin traitant !

La prise des médicaments mentionnés au verso doit être interrompue en cas d'apparition des symptômes suivants :

fièvre
vomissements ou diarrhées multiples
douleurs abdominales
sentiment de maladie prononcé

La prise doit également être interrompue en cas de jeûne (>24 heures) ou si un régime pauvre en glucides a été entamé.

La prise des médicaments mentionnés au verso doit être interrompue en cas d'apparition des symptômes suivants :

fièvre
vomissements ou diarrhées multiples
douleurs abdominales
sentiment de maladie prononcé

La prise doit également être interrompue en cas de jeûne (>24 heures) ou si un régime pauvre en glucides a été entamé.

Inhibiteurs SGLT2: _____

autres: _____

Ne reprenez ces médicaments que lorsque vous vous sentirez en bonne santé et que vous aurez recommencé à manger et à boire normalement pendant deux jours.

En cas de doute, contactez votre médecin traitant !

Inhibiteurs SGLT2: _____

autres: _____

Ne reprenez ces médicaments que lorsque vous vous sentirez en bonne santé et que vous aurez recommencé à manger et à boire normalement pendant deux jours.

En cas de doute, contactez votre médecin traitant !