

Die Einnahme der auf der Rückseite markierten Medikamente ist bei Auftreten von folgenden Symptomen zu pausieren:

Fieber
mehrfaches Erbrechen oder Durchfall
Bauchschmerzen
ausgeprägtes Krankheitsgefühl

Die Einnahme soll auch bei Fasten (>24 Std.) oder bei begonnener, kohlenhydratarmer Diät unterbrochen werden.

SGLT2-Hemmer: _____

andere: _____

Nehmen Sie diese Medikamente erst wieder ein, wenn Sie sich gesund fühlen und Sie zwei Tage wieder normal gegessen und getrunken haben.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden Arzt!

Die Einnahme der auf der Rückseite markierten Medikamente ist bei Auftreten von folgenden Symptomen zu pausieren:

Fieber
mehrfaches Erbrechen oder Durchfall
Bauchschmerzen
ausgeprägtes Krankheitsgefühl

Die Einnahme soll auch bei Fasten (>24 Std.) oder bei begonnener, kohlenhydratarmer Diät unterbrochen werden.

SGLT2-Hemmer: _____

andere: _____

Nehmen Sie diese Medikamente erst wieder ein, wenn Sie sich gesund fühlen und Sie zwei Tage wieder normal gegessen und getrunken haben.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden Arzt!

Die Einnahme der auf der Rückseite markierten Medikamente ist bei Auftreten von folgenden Symptomen zu pausieren:

Fieber
mehrfaches Erbrechen oder Durchfall
Bauchschmerzen
ausgeprägtes Krankheitsgefühl

Die Einnahme soll auch bei Fasten (>24 Std.) oder bei begonnener, kohlenhydratarmer Diät unterbrochen werden.

SGLT2-Hemmer: _____

andere: _____

Nehmen Sie diese Medikamente erst wieder ein, wenn Sie sich gesund fühlen und Sie zwei Tage wieder normal gegessen und getrunken haben.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden Arzt!

Die Einnahme der auf der Rückseite markierten Medikamente ist bei Auftreten von folgenden Symptomen zu pausieren:

Fieber
mehrfaches Erbrechen oder Durchfall
Bauchschmerzen
ausgeprägtes Krankheitsgefühl

Die Einnahme soll auch bei Fasten (>24 Std.) oder bei begonnener, kohlenhydratarmer Diät unterbrochen werden.

SGLT2-Hemmer: _____

andere: _____

Nehmen Sie diese Medikamente erst wieder ein, wenn Sie sich gesund fühlen und Sie zwei Tage wieder normal gegessen und getrunken haben.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden Arzt!