

L'assunzione dei medicinali descritti sul retro devono essere sospesi in caso di comparsa dei sintomi seguenti:

Febbre  
Episodi plurimi di vomito e/o diarrea  
Dolori addominali  
Sensazione di malessere generale

L'assunzione deve essere sospesa anche in caso di digiuno (>24 ore) o se è stato prescritto un regime povero di glucidi.

**Inibitori SGLT2:** \_\_\_\_\_

**altri:** \_\_\_\_\_

Assumete questi medicinali unicamente quando vi sentite in buona salute e siete riusciti a mangiare e bere regolarmente per due giorni.

In caso di dubbi, contattate il vostro medico curante.

L'assunzione dei medicinali descritti sul retro devono essere sospesi in caso di comparsa dei sintomi seguenti:

Febbre  
Episodi plurimi di vomito e/o diarrea  
Dolori addominali  
Sensazione di malessere generale

L'assunzione deve essere sospesa anche in caso di digiuno (>24 ore) o se è stato prescritto un regime povero di glucidi.

**Inibitori SGLT2:** \_\_\_\_\_

**altri:** \_\_\_\_\_

Assumete questi medicinali unicamente quando vi sentite in buona salute e siete riusciti a mangiare e bere regolarmente per due giorni.

In caso di dubbi, contattate il vostro medico curante.

L'assunzione dei medicinali descritti sul retro devono essere sospesi in caso di comparsa dei sintomi seguenti:

Febbre  
Episodi plurimi di vomito e/o diarrea  
Dolori addominali  
Sensazione di malessere generale

L'assunzione deve essere sospesa anche in caso di digiuno (>24 ore) o se è stato prescritto un regime povero di glucidi.

**Inibitori SGLT2:** \_\_\_\_\_

**altri:** \_\_\_\_\_

Assumete questi medicinali unicamente quando vi sentite in buona salute e siete riusciti a mangiare e bere regolarmente per due giorni.

In caso di dubbi, contattate il vostro medico curante.

L'assunzione dei medicinali descritti sul retro devono essere sospesi in caso di comparsa dei sintomi seguenti:

Febbre  
Episodi plurimi di vomito e/o diarrea  
Dolori addominali  
Sensazione di malessere generale

L'assunzione deve essere sospesa anche in caso di digiuno (>24 ore) o se è stato prescritto un regime povero di glucidi.

**Inibitori SGLT2:** \_\_\_\_\_

**altri:** \_\_\_\_\_

Assumete questi medicinali unicamente quando vi sentite in buona salute e siete riusciti a mangiare e bere regolarmente per due giorni.

In caso di dubbi, contattate il vostro medico curante.